



# SALUD APÍCOLA LATINOAMÉRICA



## Desinfección química para el material apícola de madera

### Significado de desinfección

“Destrucción o desactivación de los agentes biológicos que originan las enfermedades infecciosas que se encuentran fuera del macroorganismo animal (abeja, colmena o enjambre)”.

Kouba, 1987

**PERÚ**

## Pasos a seguir para la desinfección de los materiales apícolas de madera

### 1 PASO

#### Seleccionar el lugar donde se realizará la desinfección de los materiales.

- Realizar limpieza mecánica. Raspar los materiales.
- Colectar los desechos.
- Quemar los desechos.
- Fundir la cera.
- Colectar el propóleo.

### 2 PASO

#### Hervir los materiales.

- Utilizar soda cáustica o hidróxido de sodio al 1% por un minuto de exposición.

**Soda cáustica o hidróxido de sodio (NaOH):**  
100 litros de la disolución al 1% sirve para desinfectar 25 colmenas

**Para preparar la soda cáustica hay que tener en cuenta:**  
1% = 1 gr de producto en 100 ml de solución  
1% = 1 kilo en 100 litros

- Preparar solución en cantidad suficiente para cubrir el material que se sumergirá para hervir.
- Durante la ebullición, retirar con un colador u otro recipiente el sobrenadante (o nata) que se acumula en la superficie de la solución.
- Reponer el contenido tantas veces como sea necesario.



- » La mezcla de la soda cáustica con el agua se hace en FRÍO, para impedir que esta reacción y pueda quemar al operario.
- » La soda cáustica es corrosiva. No manipular sin protección para los ojos y la piel.

¡ATENCIÓN!

### 3 PASO

Pasar el material por agua clara para arrastrar la soda cáustica impregnada. De ser necesario, cepillar para despegar restos de cera o propóleos que puedan quedar impregnados en la superficie del material.

### 4 PASO

El material con una solución de formol (o formalina).  
100 litros sirven para desinfectar 25 cajas de colmenas.

- Concentraciones de la preparación del formol según su uso**
- » 4% para la desinfección de rutina, o en focos de loque europea, virosis, nosemosis, en presencia de cría enyesada (ascosferosis) o cría de piedra (aspergilosis)
  - » 6% en focos de loque americana

**5**  
PASO

**Secar los materiales a la sombra para evitar una rápida evaporación del formol.**

Para preparar el formol a la concentración deseada, tomar en cuenta la fórmula siguiente:

$$X = \frac{a \times b}{c}$$

x = Volumen necesario del producto comercial sin diluir (litros)

a = Concentración de solución a preparar (%)

b = Cantidad de solución que se necesita preparar (litros)

c = Concentración (%) que presenta el producto comercial a partir del cual se prepara la dilución

**¡ATENCIÓN!**

- » El formol afecta las vías respiratorias cuando se inhala. No manipular sin protección para las vías respiratorias.
- » Nunca reutilizar los materiales apícolas mientras estén húmedos o con olor al desinfectante.
- » Terminado el proceso de desinfección, para eliminar los desechos líquidos que resulten sobrantes, tener en cuenta las regulaciones ambientales establecidas en el país para el hidróxido de sodio y el formol.
- » Durante la manipulación de estos productos, evitar contaminar napas, curso de ríos, abrevaderos de animales u otros sitios que afecten el ambiente.

**EJEMPLO:**

1. Necesitamos realizar una desinfección de rutina a 50 cajas de colmenas. ¿Cuántos litros de solución de soda cáustica al 1% se necesitan, si 100 litros de la preparación alcanzan para 25 cajas de colmenas?

Respuesta: Se necesitan 200 litros de solución.

2. En este caso ¿cuántos kilos de soda cáustica se necesitan para preparar la dilución?

Respuesta: Se necesitan dos kilos para preparar 200 litros de solución.

3. Si consideramos que el formol disponible en el mercado viene al 37% ¿cuántos litros de este se requieren para preparar 200 litros de solución al 4%?

Pasos a seguir:

$$X = \frac{4\% \times 200 \text{ litros}}{40\%}$$

$$X = \frac{\cancel{4\%} \times 200 \text{ litros}}{\cancel{40\%}}$$

$$X = \frac{800 \text{ litros}}{40}$$

x= a 20 litros de formol

Respuesta: Se prepararán 200 litros de solución, por lo que se deben restar a los 200 litros de agua, los 20 litros de formol (al 40%).

**ANTES**

**DESPUÉS**



Fondos de colmena

Para este ejemplo:

200 litros de agua – 20 litros de formol = 180 litros de agua

## Salud Apícola Latinoamérica: gestión sanitaria apícola con visión preventiva

Salud Apícola Latinoamérica es un Programa liderado por UC Davis Chile Life sciences innovation center en colaboración con Bayer AG, Alemania y con el apoyo de universidades, centros de investigación y otros socios de los países en los que se trabaja

Su objetivo es entregar herramientas que permitan identificar el riesgo sanitario en el proceso productivo. Con ello se pretende alcanzar la calidad, inocuidad y trazabilidad que exige el mercado de los alimentos en la actualidad.

La iniciativa apunta a reconocer el origen multifactorial de la pérdida de salud apícola. Toma en cuenta la formación del capital humano para mejorar las prácticas en toda la cadena productiva, conciliando los intereses productivos y ambientales.

Para lograr este objetivo se desarrolla un programa que ha abarcado a Chile, Colombia, Argentina, Costa Rica y Perú. El trabajo consiste en determinar factores que influyen en la salud, rendimiento y productividad de colonias de abejas melíferas, para luego proponer estrategias que mejoren la sostenibilidad del sector apícola a través de monitoreo, capacitación y desarrollo de redes.

Los objetivos del programa son:

### Monitoreo (Sistema Salud apícola)

Conocer, caracterizar y evaluar la salud apícola en un territorio acotado aplicando el modelo de monitoreo desarrollado por el Programa Salud Apícola Latinoamérica.

### Capacitación

Desarrollar, implementar y validar modelos y métodos de capacitación en territorios específicos, que permitan impactar positivamente en la salud de las colmenas de América Latina.

### Red Salud Apícola Latinoamérica

Conformar una red latinoamericana de intercambio para generar y difundir conocimientos integrados, sistémicos y accesibles acerca de la gestión sanitaria con enfoque preventivo. Esta red está dirigida a investigadores, profesionales, técnicos y otros actores sociales.



La Universidad de California Davis (UC Davis), es uno de los 10 campus del sistema de la Universidad de California, una de las casas de estudio públicas más prestigiosas de Estados Unidos. Inaugurada en marzo de 1905, surgió con un claro énfasis en agricultura, tradición que la posiciona hoy como la N°1 a nivel mundial en investigación y formación en agricultura, forestal y veterinaria. Actualmente, UC Davis abarca las diferentes áreas del saber y forma a las nuevas generaciones de profesionales de excelencia. UC Davis Chile es una fundación privada sin fines de lucro creada por la Oficina de Regentes de la Universidad de California y administrativamente alojado en Global Affairs.



Bayer es una empresa de ciencias de la vida con gran experiencia en salud de animales y cultivos. A través de este programa materializamos nuestro compromiso con la salud de las abejas, pues entendemos que su relevancia, como polinizadoras para producir alimentos saludables, productoras de miel y para el equilibrio de muchos ecosistemas en todo el mundo.

Av. Santa María 2670, Torre B of. 206, Providencia, Santiago, Chile.

Informaciones: (+56) 9 4478 4714

[www.chile.ucdavis.edu](http://www.chile.ucdavis.edu)



Salud apícola Latinoamerica



Salud\_apicola\_latinoamerica



Salud apícola Latinoamerica

[www.saludapicola.com](http://www.saludapicola.com)

Colaboran:

